

# Stadieinddeling af lungekræft

En nøje beskrivelse af tumors udbredelse er nødvendig for at afgøre kurabilitet og herunder operabiliteten. Stadieinddeling anvendes også ved bedømmelsen af prognosen, og er aldeles afgørende i forbindelse med sammenligning af behandlingsresultater.

Det forekommer dog ofte, at patientens almentilstand, påvisning af dissemineret lidelse eller kardio-pulmonale forhold medfører inoperabilitet og gør videre udredning meningsløs.

## Tumorklassifikation - TNM

The American Joint Committee (AJC) og Union Internationale Contre le Cancer (UICC) har i 1986 defineret det internationalt anvendte TNM-klassifikationssystem (1).

**T** står for primærtumors størrelse og udstrækning, **N** for regional lymfeknude involvering, og **M** for fravær eller tilstede værelse af fjernmetastaser. Som ved andre kræftsygdomme sammenfattes TNM-kategorierne i 4 stadier.

Den kliniske stadieinddeling - benævnt cTNM - baseres på billeddiagnostiske undersøgelser og invasive diagnostiske undersøgelser. cTNM-stadiet er afgørende for behandlingsstrategien og muligheden for kurabilitet.

Den postkirurgiske/patoanatomiske stadieinddeling - benævnt pTNM - er baseret på analyser af operationspræparatet og er afgørende for prognose og for indikationen for evt. adjuverende onkologisk behandling. Der har i en årrække været arbejdet for at forbedre cTNM/pTNM-overensstemmelsen og overenstemmelsesgraden har været en indikator i det Nationale Indikator Projekt (NIP). I de seneste 5 år (2011 – 2015) har overensstemmelsen i Danmark som helhed været over 90% (2). Tilsvarende den høje overensstemmelse mellem cTNM og pTNM er fraktionen af eksplorative thoracotomier faldet fra 13,6% i perioden 2000-2004 til nu for 2014 og 2015 at være under 2% (2). Ved genoptagelse af behandling og nyklassifikation benævnes stadiet rTNM. Undertiden er det muligt ved kemo- og/eller strålebehandling at mindske cancerens udbredelse og dermed forbedre stadiet (down-staging), således at patienten kan opereres.

Den seneste revision af TNM-klassifikationen (8. udgave) implementeres i princip fra og med 2017, men af praktiske hensyn udskydes den praktiske implementering dog i bl.a. USA og også i Danmark i DLCR-sammenhæng til 1. Januar 2018.

Den reviderede stadiegruppering er resultatet af en gennemgang af et stort antal cases fra flere lungecancer databaser fra flere lande i regi af International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) og har ført til definition af nye stadier og revision af tidligere stadie-definitioner, således at nogle cases placeres i forskelligt stadiet efter hhv. 7. og 8. udgave.

Den reviderede og nugældende TNM-klassifikation er vist i nedenstående tabel 2.  
Stadiegrupperingen er vist i de efterfølgende tabeller 3a, b, c.

**Tabel 2: T-, N- og M-stadie klassifikation** iht 2017-klassifikationen (8. udgave)

**T (Primær-tumor)**

- Tx Primær-tumor kan ikke vurderes *eller* tumor påvist ved fund af maligne celler i ekspektorat eller bronkial skyllevæske, men kan ikke visualiseres ved billeddiagnostik eller bronkoskopi. (*Bør så vidt mulig ikke anvendes!\**)
- T0 Ingen påviselig primær-tumor.
- Tis Carcinoma in situ
- T1 Tumor  $\leq$  3 cm i største diameter, omgivet af lunge eller visceral pleura, uden bronkoskopisk påviselig invasion mere proksimalt end til lobære bronkus (dvs. ikke ind i hovedbronkus).<sup>1</sup>
- T1mi Minimalt invasivt adenocarcinom.<sup>2</sup>
  - T1a Tumor  $\leq$  1 cm i største diameter.<sup>1</sup>
  - T1b Tumor > 1 cm, men  $\leq$  2 cm i største diameter.<sup>1</sup>
  - T1c Tumor > 2 cm, men  $\leq$  3 cm i største diameter.<sup>1</sup>
- T2 Tumor > 3 cm, men  $\leq$  5 cm, *eller* tumor med ethvert af følgende karakteristika:
- Involverer hovedbronkus uanset afstand til hovedcarina, men uden at involvere carina
  - Invaderer viscerale pleura
  - Associeret med atelektase eller obstruktiv pneumonitis, som når til hilusregionen og involverer en del af lungen eller hele lungen.
- T2a Tumor > 3 cm, men  $\leq$  4 cm i største diameter.
- T2b Tumor > 4 cm, men  $\leq$  5 cm i største diameter
- T3 Tumor > 5 cm, men  $\leq$  7 cm i største diameter *eller* en tumor som direkte invaderer en af følgende strukturer:
- parietal pleura, thoraxvæggen (inklusiv sulcus superior tumor, nervus phrenicus, parietale pericardium)
  - eller én eller flere separate tumores i samme lungelap.
- T4 Tumor > 7 cm *eller* tumor af enhver størrelse som vokser ind i en af følgende strukturer:
- diafragma, mediastinum, hjertet, de store kar, trachea, nervus recurrens, esophagus, vertebrae, hovedcarina;
  - eller én eller flere separate tumores i en anden ipsilateral lungelap.

---

<sup>1</sup> Superficielt voksende tumor af enhver størrelse med den invasive komponent begrænset til bronchievæggen, og som må nå så langt proximalt som til hovedbronchus, klassificeres også som T1a.

<sup>2</sup> Solitært adenocarcinom ( $\leq$  3 cm), med et overvejende lepidic mønster og  $\leq$  5 mm invasion i største dimension noget steds.

## **N (Regionale Lymfeknuder)**

- Nx Regionale lymfeknuder kan ikke vurderes. (*Bør så vidt mulig ikke anvendes!\**)
- N0 Ingen regionale lymfeknude-metastaser.
- N1 Metastase i ipsilaterale peribronkiale og/eller ipsilaterale hilære lymfeknuder og intrapulmonale lymfeknuder, herunder involvering ved direkte udbredelse.
- N2 Metastase i ipsilaterale mediastinale og/eller subkarinale lymfeknuder.
- N3 Metastase i kontralaterale mediastinale, kontralaterale hilære, ipsilaterale eller kontralaterale scalener eller supraklaviculære lymfeknuder.

## **M (Metastaser)**

- M0 Ingen metastaser.
- M1 Metastase(r)
- M1a Én eller flere separate tumores i en kontralateral lungelap;  
tumor med pleurale eller perikardielle knuder eller malign pleural eller perikardiel effusion.
- M1b Én enkelt ekstrathoracal metastase – herunder i fjernereliggende lymfeknuder end N3
- M1c Flere ekstrathoracale metastaser – herunder i fjernereliggende lymfeknuder end N3

*\*) Tx, Nx og Mx bør så vidt mulig ikke anvendes, da stadietablering med få undtagelser umuliggøres, hvorved den pågældende patients data ikke kan indgå i overlevelsesanalyser.*

### Tabel 3a: Stadiegruppering

i henhold til 2009-klassifikationen (7. udgave)

T/M	N0	N1	N2	N3
<b>T1a</b>	IA	IIA	IIIA	IIIB
<b>T1b</b>	IA	IIA	IIIA	IIIB
<b>T2a</b>	IB	IIA	IIIA	IIIB
<b>T2b</b>	IIA	IIB	IIIA	IIIB
<b>T3</b>	IIB	IIIA	IIIA	IIIB
<b>T3</b>	IIB	IIIA	IIIA	IIIB
<b>T3</b>	IIB	IIIA	IIIA	IIIB
<b>T4</b>	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB
<b>T4</b>	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB
<b>M1a</b>	IV	IV	IV	IV
<b>M1a</b>	IV	IV	IV	IV
<b>M1b</b>	IV	IV	IV	IV

### Tabel 3b: Stadiegruppering

i henhold til 2017-klassifikationen (8. udgave)

T/M	N0	N1	N2	N3
Tis	0	-	-	-
<b>T1a</b>	<b>IA1</b>	IIB	IIIA	IIIB
<b>T1b</b>	<b>IA2</b>	IIB	IIIA	IIIB
<b>T1c</b>	<b>IA3</b>	IIB	IIIA	IIIB
<b>T2a</b>	IB	IIB	IIIA	IIIB
<b>T2b</b>	IIA	IIB	IIIA	IIIB
<b>T3</b>	IIB	IIIA	IIIB	<b>IIIC</b>
<b>T4</b>	IIIA	IIIA	IIIB	<b>IIIC</b>
<b>M1a</b>	<b>IVA</b>	<b>IVA</b>	<b>IVA</b>	<b>IVA</b>
<b>M1b</b>	<b>IVA</b>	<b>IVA</b>	<b>IVA</b>	<b>IVA</b>
<b>M1c</b>	<b>IVB</b>	<b>IVB</b>	<b>IVB</b>	<b>IVB</b>

Rødt markerer nye T-, M- og Stadiedefinitioner

**Tabel 3c: Stadiegruppering**i henhold til 2017-klassifikationen (8. udgave)

Occult cancer	TX	N0	M0
<u>Stage 0</u>	Tis	N0	M0
Stage IA1	T1a(mi) T1a	N0 N0	M0 M0
Stage IA2	T1b	N0	M0
<u>Stage IA3</u>	T1c	N0	M0
<u>Stage IB</u>	T2a	N0	M0
<u>Stage IIA</u>	T2b	N0	M0
Stage IIB	T1a-c T2a T2b -	N1 N1 N1 T3	M0 M0 M0 M0
Stage IIIA	T1a-c T2a-b T3 T4 -	N2 N2 N1 N0 T4	M0 M0 M0 M0 M0
Stage IIIB	T1a-c T2a-b T3 -	N3 N3 N2 T4	M0 M0 M0 M0
Stage IIIC	T3 -	N3 N3	M0 M0
Stage IVA	Any T -	Any N Any N	M1a M1b
Stage IVB	Any T	Any N	M1c