

Highlights - DLCR Årsrapport 2021


DLCR Årsmøde 22.09.22

Aarhus Universitetshospital

Henriette Engberg, Klinisk epidemiolog for DLCR i RKKP

Dagsorden

- Datagrundlag for DLCR Årsrapport 2021
- Kvalitetsindikatorer
 - Reviderede standarder
- Nye indikatorer (Kapitel 6)
- Mesotheliom - Datavalideringsrapport
- One-pager i UfL





Datagrundlag - DLCR Årsrapport 2021



Datagrundlag - Forløb efter patologidiagnose

Tabel 5.3: Oversigt over lungecancerforløbenes status på patologidata, fordelt på NSCLC og SCLC

	SCLC		NSCLC		Ingen data		I alt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Diagnoseår								
2003	550	14,8	2741	73,7	429	11,5	3720	100,0
2004	591	15,8	2735	73,1	414	11,1	3740	100,0
2005	665	16,9	2929	74,4	345	8,8	3939	100,0
2006	661	16,3	3022	74,6	368	9,1	4051	100,0
2007	638	14,8	3226	74,9	442	10,3	4306	100,0
2008	650	14,7	3335	75,4	438	9,9	4423	100,0
2009	710	16,0	3330	74,8	411	9,2	4451	100,0
2010	702	15,1	3577	76,7	383	8,2	4662	100,0
2011	697	15,0	3577	77,1	368	7,9	4642	100,0
2012	688	14,6	3676	78,3	333	7,1	4697	100,0
2013	703	15,4	3644	80,0	207	4,5	4554	100,0
2014	708	14,9	3814	80,5	215	4,5	4737	100,0
2015	682	14,5	3770	80,4	239	5,1	4691	100,0
2016	592	12,4	3993	83,5	199	4,2	4784	100,0
2017	664	13,4	4027	81,1	273	5,5	4964	100,0
2018	633	12,9	4024	82,1	243	5,0	4900	100,0
2019	651	13,0	4112	82,0	249	5,0	5012	100,0
2020	614	12,5	4049	82,2	260	5,3	4923	100,0
2021	619	12,4	4100	81,9	285	5,7	5004	100,0
Total	12418	14,4	67681	78,5	6101	7,1	86200	100,0

Årsrapport 2019-2020:

N=4852 i 2020.

Ca. 1-2%
efterindberetninger af
forløb.

Stadiefordeling - cTNM - 2021

7.1.5.3 Tabel cTNM Stadiefordeling 2021 – afdelinger i %

	I alt	IA	IB	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IIIC	IVA	IVB	Uoplyst
Bispebjerg	609	19.2	9.9	1.5	5.4	5.6	8.4	2.6	11.5	35.6	0.3
Gentofte	592	22.5	7.9	2.0	5.6	8.3	7.6	1.9	12.0	32.3	.
Næstved	407	10.8	6.4	2.0	7.4	6.6	6.6	4.9	13.5	38.3	3.4
Roskilde	433	10.9	6.9	2.1	7.6	11.3	6.0	2.8	14.5	33.3	4.6
Odense	479	18.8	3.8	1.3	6.3	9.0	6.9	2.1	10.9	39.0	2.1
Sønderborg	198	18.2	5.6	3.0	5.1	12.1	3.0	3.0	10.1	39.4	0.5
Vejle	523	21.0	3.6	1.0	6.7	9.6	8.2	1.5	11.9	31.9	4.6
Aarhus	450	22.4	3.1	2.7	6.9	9.6	5.8	3.6	8.9	36.7	0.4
Holstebro	286	27.3	6.3	2.1	6.3	7.3	4.5	2.4	7.3	35.3	1.0
Randers	183	14.2	2.2	2.7	6.6	7.1	6.0	2.2	8.7	39.9	10.4
Silkeborg	72	18.1	5.6	1.4	8.3	1.4	6.9	4.2	8.3	45.8	.
Skive/Viborg	150	21.3	4.0	.	8.7	6.7	5.3	3.3	10.0	40.0	0.7
Aalborg	591	16.6	13.4	1.2	7.4	9.0	9.1	2.7	8.0	31.6	1.0
Total	4973	18.6	6.8	1.7	6.6	8.4	7.0	2.7	10.8	35.4	2.1

Per 2. marts 2022:

2020:

Missing = 1,8%

Range 1,0%-6,1%

2019:

Missing = 3,0%

Range 0,6%-5,7%

2021: Missing = 2,1%, range (0%-10,4%)



Kvalitetsindikatorer




Reviderede standarder, DLCR Årsrapport 2021

- Behov for revision af standarder.
- Høring i DLCG af forslag til revision af standarder, jan 2022.
- DLCG konsensus beslutning om revision af standarder, feb. 2022.
- Type: Mindstemål vs. målsætning?
- Implementering i DLCR Årsrapport 2021, også bagud i tid.
- Reviderede standarder + type angivet ved hver indikator.

Et- og toårs overlevelse efter diagnose


Etårs overlevelse efter diagnose

Indikator Ia_Bopæl: Andel af patienter, som overlever 1 år fra diagnosedato efter bopælsregion. Trendgraf på regionsniveau.



Toårs overlevelse efter diagnose

Indikator Ib_Bopæl: Andel af patienter, som overlever 2 år fra diagnosedato efter bopælsregion. Trendgraf på regionsniveau.



Indikator Ic - Femårs overlevelse efter diagnose


- efter bopælsregion ved diagnose

Indikator Ic_Bopæl: Andel af patienter, som overlever 5 år fra diagnosedato efter bopælsregion

	Standard	Tæller/ nævner	Uoplyst antal (%)	Aktuelle år		Tidligere år		
	≥ 18% opfyldt			01.01.2016 - 31.12.2016	95% CI	2015	2014	2013
Danmark	Ja	1.004 / 4.773	0 (0)	21,0	(19,9-22,2)	18,2	16,8	15,9
Hovedstaden	Ja	245 / 1.204	0 (0)	20,3	(18,1-22,7)	18,1	17,4	15,4
Sjælland	Nej	152 / 874	0 (0)	17,4	(14,9-20,1)	16,8	12,9	14,3
Syddanmark	Ja	226 / 1.079	0 (0)	20,9	(18,6-23,5)	20,0	16,0	17,3
Midtjylland	Ja	255 / 1.052	0 (0)	24,2	(21,7-26,9)	16,5	18,2	16,9
Nordjylland	Ja	126 / 564	0 (0)	22,3	(19,0-26,0)	20,5	20,5	14,9

Standard: ≥18% (målsætning)


Indikator Ic_Bopæl: Andel af patienter, som overlever 5 år fra diagnosedato efter bopælsregion. Trendgraf på regionsniveau.



Kaplan-Meier estimeret femårs overlevelse efter diagnose

- efter bopælsregion ved diagnose

8.1.1.1b Figur Overlevelse efter diagnose, stratificeret for bopælsregion ved diagnose



Tabel 8.1.1.1 - KM-estimeret 5-års overlevelse, 2016-2021 (N=25000):

Bopælsregion	5-års overlevelse (%)	95%CI
Hovedstaden	0,24	0,23-0,26
Midtjylland	0,25	0,24-0,27
Nordjylland	0,24	0,22-0,26
Sjælland	0,19	0,18-0,21
Syddanmark	0,23	0,22-0,24
Danmark	0,23	0,23-0,24


Indikator III - Overensstemmelse mellem cTNM og pTNM

- efter udredende sygehus og region for udredende sygehus

Indikator III: Andel af patienter med overensstemmelse mellem cTNM og pTNM

	Standard	Tæller/ nævner	Uoplyst antal (%)	Aktuelle år		Tidligere år		
	≥ 94% opfyldt			01.01.2021 - 31.12.2021 Andel 95% CI		2020 Andel	2019 Andel	2018 Andel
Danmark	Nej	1.131 / 1.208	0 (0)	93,6 (92,1-94,9)		94,3	94,2	91,8
Hovedstaden	Ja	352 / 368	0 (0)	95,7 (93,0-97,5)		94,7	93,2	91,4
Sjælland	Nej	153 / 166	0 (0)	92,2 (87,0-95,8)		90,7	89,7	88,7
Syddanmark	Nej	193 / 221	0 (0)	87,3 (82,2-91,4)		94,0	94,6	89,8
Midtjylland	Ja	246 / 255	0 (0)	96,5 (93,4-98,4)		96,8	96,2	93,8
Nordjylland	Ja	187 / 198	0 (0)	94,4 (90,3-97,2)		93,3	97,4	94,7
Hovedstaden	Ja	352 / 368	0 (0)	95,7 (93,0-97,5)		94,7	93,2	91,4
Bispebjerg	Ja	168 / 177	0 (0)	94,9 (90,6-97,6)		95,8	91,9	90,4
Gentofte	Ja	184 / 191	0 (0)	96,3 (92,6-98,5)		93,8	94,3	92,4
Sjælland	Nej	153 / 166	0 (0)	92,2 (87,0-95,8)		90,7	89,7	88,7
Næstved	Nej	68 / 77	0 (0)	88,3 (79,0-94,5)		91,9	86,4	86,9
Roskilde	Ja	85 / 89	0 (0)	95,5 (88,9-98,8)		89,5	93,0	90,5
Syddanmark	Nej	193 / 221	0 (0)	87,3 (82,2-91,4)		94,0	94,6	89,8
Odense	Nej	78 / 89	0 (0)	87,6 (79,0-93,7)		93,4	96,7	90,6
Sønderborg	Nej	25 / 30	0 (0)	83,3 (65,3-94,4)		100,0	100,0	87,5
Vejle	Nej	90 / 102	0 (0)	88,2 (80,4-93,8)		92,4	90,9	90,2
Midtjylland	Ja	246 / 255	0 (0)	96,5 (93,4-98,4)		96,8	96,2	93,8
Aarhus	Nej	92 / 98	0 (0)	93,9 (87,1-97,7)		95,7	97,9	92,0
Holstebro	Ja	69 / 72	0 (0)	95,8 (88,3-99,1)		98,5	93,1	92,5
Randers	Ja	38 / 38	0 (0)	100,0 (90,7-100,0)		95,3	92,5	97,7
Silkeborg	Ja	20 / 20	0 (0)	100,0 (83,2-100,0)		100,0	100,0	97,1
Skive/Viborg	Ja	27 / 27	0 (0)	100,0 (87,2-100,0)		96,6	100,0	93,3
Nordjylland	Ja	187 / 198	0 (0)	94,4 (90,3-97,2)		93,3	97,4	94,7
Aalborg	Ja	187 / 198	0 (0)	94,4 (90,3-97,2)		93,3	97,4	94,7


Indikator III: Andel af patienter med overensstemmelse mellem cTNM og pTNM. Trendgraf på regionsniveau.



Indikator IV - Resektionsrate (NSCLC)

- efter bopælsregion ved diagnose

Indikator IV_Bopæl: Andel af patienter med ikke småcellet lungecancer, hvor der er foretaget resektion efter bopælsregion. Trendgraf på regionsniveau.



Region Nordjylland

Region Hovedstaden


Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Indikator Vb - Andel NSCLC patienter med kurativt intenderet behandling - efter bopælsregion ved diagnose

Figur 3.5.4: Trend for indikator Vb efter patientens bopælsregion ved diagnose, 2013-2021



Region Syddanmark, Nordjylland,
Midtjylland, Hovedstaden

Region Sjælland

Standard: $\geq 40\%$

Nye indikatorer i DLCR - Kapitel 6

Indikator	Indikator beskrivelse	Opgørelsesperiode	Tidsreference	Population	Organisation	Standard
Indikator VI	Overlevelse efter gennemført kurativt intenderet onkologisk behandling.	Opgøres for 2017-2020 afhængigt af opfølgningstid: 90 dage, 1-, 2-, og 5-års overlevelse.	<u>Opgørelsesår:</u> Dato for start på kurativt intenderet onkologisk behandling <u>Start på opfølgningstid:</u> Dato for sidste behandling i serien af gennemført kurativt intenderet onkologisk behandling	Samlet population, og stratificeret for behandlingstype: Stereotaksi og konventionel strålebehandling.	Behandlerende onkologisk afdeling og bopælsregion ved diagnose.	90 dage: ≥96% 1 år: ≥80% 2 år: ≥55% 5 år: ≥20%
Indikator VII	Andel af NSCLC c-stadie IV patienter, som modtager onkologisk behandling inden for 365 dage efter diagnosedato.	Opgøres for 2017-2020.	Diagnosedato	Samlet population (c-stadie IV) og stratificeret for hhv. stadie IVa og IVb.	Udredende afdeling og bopælsregion ved diagnose.	≥70%
Indikator VIII	Andel af NSCLC c-stadie I og II patienter, som modtager kurativt intenderet behandling inden for 90 dage efter diagnosedato.	Opgøres for 2017-2021.	Diagnosedato	Samlet population af c-stadie I og II NSCLC patienter.	Udredende afdeling og bopælsregion ved diagnose.	≥90%
Indikator IX	Andel patienter, som er drøftet på MDT konference inden for 90 dage efter dato for forløbsstart (diagnosedato).	Opgøres for 2021.	Diagnosedato	Samlet population af patienter med lunge-(DC34) eller luftrørscancer (DC33).	Udredende afdeling og bopælsregion ved diagnose	≥95%

Indikator VIIa: Andel NSCLC stadie IV patienter, som modtager onkologisk behandling inden for 365 dage efter diagnosedato – efter bopælsregion ved diagnose, 2017-2020

Tabel 6.20. Indikator VIIa: Andel NSCLC stadie IV patienter, som modtager onkologisk behandling inden for 365 dage efter diagnosedato - efter bopælsregion ved diagnose, 2017-2020

	2017			2018			2019			2020		
	nævner	tæller	andel	nævner	tæller	andel	nævner	tæller	andel	nævner	tæller	andel
Hovedstaden	493	355	72,0	466	349	74,9	509	405	79,6	482	370	76,8
Sjælland	328	211	64,3	307	217	70,7	315	220	69,8	338	238	70,4
Syddanmark	403	305	75,7	417	304	72,9	400	309	77,3	375	282	75,2
Midtjylland	366	256	69,9	375	280	74,7	368	276	75,0	388	292	75,3
Nordjylland	164	107	65,2	185	117	63,2	176	113	64,2	191	123	64,4
DK	1754	1234	70,4	1750	1267	72,4	1768	1323	74,8	1774	1305	73,6

Standard:
≥70%

Indikator VIIIa: Andel NSCLC stadie I og II patienter, som modtager kurativt intenderet behandling inden for 90 dage efter diagnosedato (resektion eller stereotaktisk stråleterapi (≥ 3 behandlinger) eller konventionel stråle (≥ 20 behandlinger)) - efter bopælsregion ved diagnose, 2017-2021

Tabel 6.26. Indikator VIIIa: Andel NSCLC stadie I og II patienter, som modtager kurativt intenderet behandling inden for 90 dage efter diagnosedato (resektion eller stereotaktisk stråleterapi (≥ 3 behandlinger (BWGC23)) eller konventionel stråle (≥ 20 behandlinger)) - efter bopælsregion ved diagnose, 2017-2021

N= Nævner, T = Tæller

	2017			2018			2019			2020			2021		
	N	T	andel	N	T	andel	N	T	andel	N	T	andel	N	T	andel
Bopælsregion															
Hovedstaden	304	220	72,4	312	231	74,0	362	272	75,1	379	306	80,7	419	348	83,1
Sjælland	203	142	70,0	210	146	69,5	231	174	75,3	212	149	70,3	219	153	69,9
Syddanmark	330	279	84,5	344	278	80,8	311	264	84,9	299	267	89,3	317	283	89,3
Midtjylland	307	216	70,4	351	268	76,4	366	277	75,7	359	295	82,2	376	290	77,1
Nordjylland	202	158	78,2	190	157	82,6	169	128	75,7	197	153	77,7	219	161	73,5
DK	1346	1015	75,4	1407	1080	76,8	1439	1115	77,5	1446	1170	80,9	1550	1235	79,7

Standard:
 $\geq 90\%$

Indikator IX: Andel patienter, som er drøftet på MDT konference inden for 90 dage efter dato for forløbsstart (diagnosedato) – efter udredende afdeling og bopælsregion ved diagnose, 2021.

Indikator IX: Andel patienter, som er drøftet på Multi-disciplinær Teamkonference (MDT) inden for 90 dage efter dato for forløbsstart (diagnosedato)

	Standard ≥ 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst antal (%)	Aktuelle år 01.01.2021 - 31.12.2021	
Danmark	Nej	1.938 / 5.004	0 (0)	38,7	(37,4-40,1)
Hovedstaden	Nej	443 / 1.218	0 (0)	36,4	(33,7-39,1)
Sjælland	Nej	331 / 844	0 (0)	39,2	(35,9-42,6)
Syddanmark	Nej	204 / 1.206	0 (0)	16,9	(14,8-19,2)
Midtjylland	Nej	622 / 1.144	0 (0)	54,4	(51,4-57,3)
Nordjylland	Nej	338 / 592	0 (0)	57,1	(53,0-61,1)
Hovedstaden	Nej	443 / 1.218	0 (0)	36,4	(33,7-39,1)
Bispebjerg	Nej	161 / 614	0 (0)	26,2	(22,8-29,9)
Gentofte	Nej	282 / 604	0 (0)	46,7	(42,7-50,8)
Sjælland	Nej	331 / 844	0 (0)	39,2	(35,9-42,6)
Næstved	Nej	305 / 410	0 (0)	74,4	(69,9-78,5)
Roskilde	Nej	26 / 434	0 (0)	6,0	(4,0-8,7)
Syddanmark	Nej	204 / 1.206	0 (0)	16,9	(14,8-19,2)
Odense	Nej	118 / 481	0 (0)	24,5	(20,7-28,6)
Sønderborg	Nej	38 / 199	0 (0)	19,1	(13,9-25,3)
Vejle	Nej	48 / 526	0 (0)	9,1	(6,8-11,9)
Midtjylland	Nej	622 / 1.144	0 (0)	54,4	(51,4-57,3)
Aarhus	Nej	362 / 452	0 (0)	80,1	(76,1-83,7)
Holstebro	Nej	84 / 286	0 (0)	29,4	(24,2-35,0)
Randers	Nej	59 / 183	0 (0)	32,2	(25,5-39,5)
Silkeborg	Nej	38 / 72	0 (0)	52,8	(40,7-64,7)
Skive/Viborg	Nej	79 / 151	0 (0)	52,3	(44,0-60,5)
Nordjylland	Nej	338 / 592	0 (0)	57,1	(53,0-61,1)
Aalborg	Nej	338 / 592	0 (0)	57,1	(53,0-61,1)

Indikator IX_Bopæl: Andel patienter, som er drøftet på Multi-disciplinær Teamkonference (MDT) inden for 90 dage efter dato for forløbsstart (diagnosedato) efter bopælsregion

	Standard ≥ 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst antal (%)	Aktuelle år 01.01.2021 - 31.12.2021	
Danmark	Nej	1.926 / 4.973	0 (0)	38,7	(37,4-40,1)
Hovedstaden	Nej	436 / 1.200	0 (0)	36,3	(33,6-39,1)
Sjælland	Nej	333 / 875	0 (0)	38,1	(34,8-41,4)
Syddanmark	Nej	198 / 1.159	0 (0)	17,1	(15,0-19,4)
Midtjylland	Nej	618 / 1.144	0 (0)	54,0	(51,1-56,9)
Nordjylland	Nej	341 / 595	0 (0)	57,3	(53,2-61,3)

Afdelinger - Range (6,0%-80,1%)

Regioner - Range (17,1%-57,3%)

Intra- og interregionale forskelle.

Mesotheliom - Den første *Datavalideringsrapport 2021*

- selvstændig rapport i relation til DLCR årsrapport

- Population 2010-2021
- Demografi og behandling
- Overlevelse efter diagnose og resektion
- Kvalitetsindikatorer

Deskriptivt:

- ≈ 120-160 incidente patienter i DK per år
- 70% af patienterne er 60-79 år ved diagnose
- 80-85% er mænd
- Epiteloidt og bifasisk mesotheliom optræder hyppigst
- ≈ 16% kan resekeres
- 75-80% modtager systemisk terapi (kemoterapi)
- 10-15% modtager stråleterapi

Ikke inkluderet i rapporten:

- cTNM stadie
- Charlson Komorbiditet

Datavalidering efter audit:

- Patologisk diagnose
- Kirurgiske patienter

Mesotheliom - Kvalitetsindikatorer

Indikator	Indikator beskrivelse	Opgørelsesperiode	Tidsreference	Population	Organisation	Standard
Indikator I	Overlevelse efter mesotheliom diagnose	Opgøres for 2010-2021 for aggregerede patientkohorter som KM estimeret overlevelse til tid t= 1 år, 2 år og 5 år.	Diagnosedato	Samlet population af patienter med mesotheliom diagnose.	Bopælsregion ved diagnose.	Afventer
Indikator II	Resektionsrate (andel)	Opgøres for 2010-2021 som simpel andel.	Diagnosedato	Samlet population af patienter med mesotheliom diagnose.	Bopælsregion ved diagnose.	Afventer
Indikator III	Overlevelse efter resektion	Opgøres for 2010-2021 for aggregerede patientkohorter som KM estimeret overlevelse til tid t= 30 dage, 1 år, 2 år og 5 år.	Resektionsdato	Populationen af patienter, hvor der er foretaget resektion.	Ingen	Afventer

Indikator I: Overlevelse efter mesotheliom diagnose, 2010-2021

- Kaplan-Meier estimeret overlevelse

Etårs overlevelse:

Bopælsregion	2019-2021 (n=431) %(95CI)	2016-2018 (n=435) %(95CI)	2013-2015 (n=379) %(95CI)	2010-2012 (n=372) %(95CI)
Danmark	0,60 (0,55-0,64)	0,53 (0,48-0,57)	0,58 (0,52-0,62)	0,52 (0,47-0,57)

Toårs overlevelse:

Bopælsregion	2019-2021 (n=431) %(95CI)	2016-2018 (n=435) %(95CI)	2013-2015 (n=379) %(95CI)	2010-2012 (n=372) %(95CI)
Danmark	- NA -	0,29 (0,24-0,33)	0,25 (0,20-0,29)	0,24 (0,20-0,29)

Femårs overlevelse:

Bopælsregion	2019-2021 (n=431) %(95CI)	2016-2018 (n=435) %(95CI)	2013-2015 (n=379) %(95CI)	2010-2012 (n=372) %(95CI)
Danmark	- NA -	0,09 (0,06-0,12)	0,08 (0,06-0,11)	0,08 (0,05-0,10)


Indikator II: Resektionsrate, 2010-2021

Årstal for diagnose	Bopælsregion	Tæller / Resecerede pt.	Nævner / Incidente pt.	Andel resecerede pt. (%)
2010	Danmark	16	117	14%
2011	Danmark	18	123	15%
2012	Danmark	23	132	17%
2013	Danmark	15	113	13%
2014	Danmark	18	129	14%
2015	Danmark	35	137	26%
2016	Danmark	25	142	18%
2017	Danmark	14	139	10%
2018	Danmark	28	154	18%
2019	Danmark	24	163	15%
2020	Danmark	26	144	18%
2021	Danmark	10	124	8%

2010-2021:

N=252 resektioner

Indikator III: Overlevelse efter resektion, 2010-2021



Tabel 3.5. Kaplan-Meier estimeret overlevelse efter resektion, 2010-2021 (n=257).

Overlevelse	2018-2021 (n=91) %(95CI)	2014-2017 (n=89) %(95CI)	2010-2013 (n=77) %(95CI)
30-dages overlevelse	100%	100%	100%
Etårs overlevelse	0,93 (0,85-0,97)	0,83 (0,74-0,89)	0,82 (0,71-0,89)
Toårs overlevelse	0,69 (0,57-0,79)	0,56 (0,45-0,66)	0,44 (0,33-0,55)
Femårs overlevelse	- NA -	0,22 (0,14-0,32)	0,18 (0,11-0,27)

N=257
resektioner

One-pager i UfL - DLCR Årsrapport 2021



UGESKRIFTET.dk

KVALITETSUDVIKLING 2022

Organdonationsdatabasen – Resumé af årsrapport 2021

NYHED |
Kvalitetsudviklingsartikel 19/09

Dansk Anæstesi Database – Resumé af årsrapport 2021

NYHED | Kvalitetsudvikling
12/09

Dansk Testis Cancer Database – resumé af årsrapport 2021

NYHED |
Kvalitetsudviklingsartikel 05/09

DANARREST – Registrering af hjertestop på hospital – Resumé af årsrapport 2021

NYHED | Kvalitetsudvikling
11/07

Hudkræftdatabasen (NMSC) – Resumé af årsrapport 2020/2021

NYHED | Kvalitetsudvikling
31/05

Dansk Korsbåndes Rekonstruktions Register - Resumé af årsrapport 2020/2021

NYHED | Kvalitetsudvikling
09/05


Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi – Præsentation af de første data

NYHED | Kvalitetsudvikling
02/05

Præhospitalsdatabasen – Resumé af årsrapport 2020

NYHED | Kvalitetsudvikling
25/04

<https://ugeskriftet.dk/kvalitetsudvikling>



**Tak for
opmærksomheden**


Datagrundlag - Kønsfordeling over tid

7.1.1.4 Tabel Kønsfordeling over tid i absolutte tal og i %

	Total		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2003 - 2015	
	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal
Mænd	51.1	43812	48.2	2396	48.3	2364	48.7	2434	48.9	2382	50.1	2478	49.9	2384	52.2	29374
Kvinder	48.9	41936	51.8	2577	51.7	2529	51.3	2560	51.1	2490	49.9	2472	50.1	2390	47.8	26918

Absolute numbers, Incidence, Males and Females

Lung
Denmark



Nordcan | IARC - All Rights Reserved 2022 - Data version: 9.2 - 23.06.2022

NORDCAN
Association of the Nordic Cancer Registries

DLCR - 2020: N=4893

NORDCAN - 2020: N=5072

Dækningsgrad - DLCR:

Christensen J, Kejs AMT, Schmidt LKH, Søgaard J, Rasted MC, Andersen O, Jakobsen E. *Agreement between the Danish Cancer Registry and the Danish Lung Cancer Registry.* Dan Med J 2020;67(8):A04190257